

В Израиле опубликован отчет Центрального статистического бюро об основных причинах смертности в стране.



Отчет доказывает, что общий уровень смертности на 100 тысяч жителей Израиля ниже, чем в большинстве развитых стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития.

Израильяне реже умирают от ишемической болезни сердца и от рака. Исключением является рак груди, от которого израильские женщины умирают чаще, чем жительницы в других развитых странах. Смертность от инсульта в Израиле на рекордно низком уровне.

А вот ситуация со смертностью от диабета, болезней почек и от инфекционных заболеваний далеко не радужная. Как сообщает центр "Исроиль", по показателю смертности от диабета Израиль опережает только Мексика.

Наиболее распространенными причинами смерти в Израиле остаются онкологические и сердечнососудистые заболевания. Мужчины чаще умирают от злокачественных опухолей трахеи, бронхов и легких, женщины умирают от рака молочной железы. На втором месте у обоих полов находится рак толстой кишки и прямой кишки. Третьей по распространенности причиной смерти среди женщин является диабет, среди мужчин он занимает 4-е место.

Различные причины, не связанные с болезнями (ДТП, несчастные случаи, самоубийства, убийства и т.д.) являются 3-й по распространенности причиной смерти среди мужчин и 8-й - среди женщин. Количество смертей в результате ДТП среди мужчин втрое больше, чем среди женщин.

{pageviews 00 none}    Информация предоставлена сайтом: [www.assaf.ru](#)

---