

Прививки от одних заболеваний при попадании в организм могут увеличивать риск развития других – к такому неожиданному выводу пришли ученые из Германии. Новая работа была организована общественной организацией - Альянс свободы здоровья.

В ней было установлено, что дети, которые были вакцинированы в соответствии с официальным графиком правительства, имели в пять раз больше шансов на развитие ряда болезней, от которых прививка их не защищала. Их результаты сопоставлялись с данными детей, проживавшими в той же местности, в точно таких же условиях, которые по тем или иным причинам отказывались от вакцины.

Обзор включает в себя 8000 привитых и ровно столько же не привитых детей, и из-за малой выборки его данные пока не могут восприниматься как официально доказанные. Исследователи отмечают, что необходимо проведение более масштабных работ на данную тему, для того, чтобы соотношение всех рисков от прививок было более наглядным.



Вместе с тем, ученые напоминают, что большинство вакцин и прививок не проходит тестов на наличие долгосрочных побочных эффектов, в том числе в виде снижения иммунитета, что является недопустимым, ведь ежедневно ту же вакцину от гриппа используют в количестве нескольких миллиардов ампул по всему миру.

Если допустить, что у такой вакцины есть побочные эффекты, которые проявляются не моментально, то масштаб последствий от использования таких прививок действительно может быть шокирующим. Согласно итоговой статистике, приводимой исследователями, привитые дети почти в два раза чаще непривитых детей болели нейродермитом - заболеванием кожи, которое характеризуется хроническим зудом и царапинами.

Точно так же, привитых детей примерно в два с половиной раза чаще, имели мигрень. Аналогичный риск по астме и хроническому бронхиту был превышен в восемь раз. По гиперактивности, сенной лихорадки и заболеваниям щитовидной железы риск был повышен в три раза, четыре и семнадцать раз.

Масштаб исследования не позволил сделать выводы об аналогичных рисках по развитию аутизма. В группе вакцинированных детей аутизм развился в четырех случаях, в то время как в группе невакцинированных детей таких случаев не было. В настоящее

время в Германии распространенность аутизма среди населения составляет 1,1 процент. Таким образом, в группе привитых детей он был в два с половиной раза выше нормальных показателей.

По материалам Natural News

{jpageviews 00 none} *Информация предоставлена сайтом www.medicinae.ru*
